

HYALO4 START**KULLANIM TALİMATLARI****Ürün Açıklaması**

HYALO4 START, bakteriyel fermentasyon ile ana bileşen olarak elde edilen sodyum hyaluronat ve patojen olmayan *Vibrio alginolyticus*'dan elde edilen bakteriyel kollajenaz içeren, birlikte bir tıbbi madde olarak topikal uygulanan sıvı bir merhemdir.

HYALO4 START, yeni canlı dokuyu koruyan ve doğal tamir sürecini destekleyen hyaluronik asidin nemlendirici özelliği sayesinde yara yatağının hazırlanmasını sağlar. Aslında, lezyonların iyileşmesi nemli ortamda daha hızlı meydana gelir. Bakteriyel kollajenaz yara yatağı hazırlanmasına yardımcı olur.

Bileşim

Ana bileşen: sodyum hyaluronat %0.2

Diğer bileşenler: kollajenaz (merhemde en az 2.0 nkat/g), hafif likit parafin, beyaz vazelin.

Endikasyonlar

Kronik ülserlerin lokal tedavisi (örn. Bası yaraları, vasküler bacak ülserleri, diyabetik ülserler). Özellikle, doğal iyileşme sürecini destekleyecek ideal nemli bir ortam ve yara yatağı hazırlama amaçlanmaktadır.

Dozaj ve Uygulama

Uygulama öncesi yaralar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Başarılı bir tedavi sağlamak için lezyon alanında yeterli nemlilik olmalıdır. Kuru lezyonlar fizyolojik solüsyonlarla (%0.9 NaCl) veya glikoz çözeltisi gibi doku tarafından iyi tolere edilen solüsyonlarla nemlendirilmelidir. Sert yara kabukları ıslak pansuman ile yumuşatılmalıdır.

HYALO4 START'ı günde bir kez veya doktorunuzun tavsiye ettiği sıklıkta yara üzerine 2 mm bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayın. Uygun teması sağlamak için merhem uygulanan alanı steril bir örtü ile kapatın.

Gebelik ve Emzirme

Hekim tarafından önerilmişse, HYALO4 Start gebelik ve emzirme sırasında kullanılabilir.

Kontraendikasyonlar

Ürün bileşenlerine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar HYALO4 START'ı kullanmamalıdır.

Uyarılar ve önlemler

Ürünün 30 günden fazla bir süre kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Enfeksiyon komplikasyonu olması durumunda doktorunuza danışın. HYALO4 START ile tetrasiklin lokal olarak birlikte kullanılmamalıdır.

Kuaterner amonyum tuzları, gümüş ve diğer ağır metaller içeren sabunlar/deterjanlar ve dezenfektanlarla ürünü birlikte kullanmayın. Kullanılabilecek ürünleri doktorunuza sorun.

Açık tendon ve kıkırdaklarda kullanmayınız.

Göz ve mukozaya temasından kaçınınız.

Kazara yutulması veya solunması durumunda derhal doktorunuza danışınız.

Merhemin t p n n direk yaraya temas etmesinden ka ınınız.

Her kullanımdan sonra merhemin kapa ını kapatınız.

Paket hasarlı ise kullanmayınız

 r n a ıldıktan sonra en fazla 36 ay kullanılabilir.

Pakette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi do ru saklanmış  r nler i in ge erlidir.

Kullandıktan sonra  lkenizin kuralları  er evesinde imha ediniz.

 ocukların erişemeyece i yerde saklayınız.

Beklenmeyen Etkiler

Acı, kaşıntı, yanma, kızarıklık gibi beklenmeyen lokal etkiler meydana gelebilir. r n n bile enlerine aşırı duyarlılı ı olan hastalar dı ında sistematik beklenmeyen etki meydana gelmez.

Saklama

30 C'nin altında saklayınız.

Dondurmayınız.

Sunum  ekli

15 gr , 30 gr ve 50 gr t p

 retici

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (PD) Italy



Kullanım talimatının en son revizyon tarihi: Ocak 2014